

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

70  
BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.  
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

BULLETIN N°43 D'AVRIL 1964

10 9 avril 1964

## VIGNE

### INFORMATIONS

#### Vers gris

Parfois, les chenilles de diverses noctuelles causent localement des dégâts importants, notamment sur les jeunes plants; entre le débourrement et l'étalement des premières feuilles, elles dévorent les jeunes pousses ou évident les bourgeons.

Dès l'observation de dégâts éventuels, il conviendrait de lutter immédiatement :

- soit par poudrage ou pulvérisation du pied des ceps et du sol environnant avec des insecticides de synthèse tels que D.D.T., H.C.H., lindane, toxaphène ou aldrine,
- soit surtout par épandage d'appâts empoisonnés à base de son "frisé" additionné de 200 gr d'aldrine ou de 400 gr de chlordane (en matière active) pour 100 Kgs de son sec.

## ARBRES FRUITIERS

### AVERTISSEMENTS

#### Tavelure du poirier

Il y a lieu de traiter dès à présent les arbres ayant atteint ou dépassé le stade végétatif C3.

#### Tavelure du pommier

Effectuer un traitement dès réception de cet avis sur les arbres ayant atteint le stade C3. Jusqu'ici les conditions climatiques n'ont pas été favorables à la projection des ascospores qui pourrait se produire de façon massive au cours des prochaines pluies.

### INFORMATIONS

#### Oïdium du pommier

Ajouter un produit à base de soufre ou de dinitrophenylcrotonate à la bouillie antitavelure en tenant compte éventuellement de la compatibilité des produits.

DLP 16-4-64 297893

P.1188



### Monilia du cerisier

Effectuer un traitement sur les arbres ayant atteint le stade de sensibilité si aucun traitement n'a encore été fait.

### Monilia du prunier

Les fleurs de prunier sont très sensibles à la moniliose. Il y a lieu d'exécuter un traitement fongicide à l'aide d'une bouillie renfermant 250 gr. de cuivre métal par hectolitre ou d'un produit organique de synthèse, thirame, captane, zinèbe, zirame ou dichlone.

### Anthonome du pommier

Des piqûres nutritiales sur les boutons à fleurs apparaissent dans les vergers voisins d'arbres négligés; effectuer un traitement à l'aide de produits organo-chlorés.

### Puceron vert

Les premiers pucerons verts sont signalés sur pommiers; profiter des traitements dirigés contre la tavelure et l'oïdium pour lutter contre ces parasites en ajoutant aux bouillies fongicides un des produits conseillés par la Station d'Avertissements.

### Péritèle

Surveiller attentivement les vergers et s'il y a lieu, intervenir aussitôt à l'aide d'un des produits suivants : D.D.T., H.C.H., lindane, dieldrine.

## PRODUITS PESTICIDES

Des erreurs s'étant glissées dans la liste des produits conseillés en 1964, il convient d'apporter à celle-ci les modifications suivantes :

- a) Black-rot de la vigne : l'association de carbatène et de cuivre n'est pas homologuée, mais seulement en autorisation provisoire de vente.
- b) Petite altise du colza : D.D.T. et D.D.D. sont homologués à 600 g par hectare et non pas à 60 g/ha.
- c) Acarie des arbres fruitiers : Le diméthoate est homologué à 30 g par hectolitre; il convient donc de le supprimer de la liste des produits en autorisation provisoire de vente.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytopathologique de REIMS,